

Ledtrådar till lektionsuppgifter

Allmänna råd vid lösning av lektionsuppgifter:

- Försök inledningsvis att lösa uppgiften på egen hand, genom att omsätta innehållet i den tillhörande föreläsningen samt innehållet i läroboken.
- I andra hand försök att lösa uppgiften med hjälp av inledande ledtrådar nedan.
- I tredje hand försök att lösa uppgiften i dialog med en kamrat.
- I fjärde hand försök att lösa uppgiften med annan hjälp, t.ex. läraren eller andra studenter.

Ledtrådar för lösning av uppgifter efter föreläsning 1:

Ö6.7 a-d) Substitution av "inre funktionen"

Ö6.8 a-d) Derivatans av nämnaren i täljaren...

Ö6.9 a-d) Substitution av "inre funktionen"

L5.9

- Substitution av "inre funktionen"
- Förlängning med e^x och sedan substitution av e^x
- Substitution av $\ln x$
- Substitution av $x = t^2$

Ö6.11

- Substitution av $\arcsin x$
- Standardprimitiv "k"
- Substitution av e^x
- Partiell integration
- Partiell integration
- Substitution av "inre funktionen"
- Substitution av "inre funktionen"
- Substitution $t = x^2$ och sedan partiell integration

L5.11

- Derivatans av nämnaren i täljaren...
- Substitution av "inre funktionen" följt av partiell integration
- Substitution av hela nämnare
- Substitution av $\ln x$
- Substitution $x = t^2$ följt av partiell integration
- Uppdelning i separata integraler, den ena med substitutionen $x = t^2$, den andra genom substitution av "inre funktionen"

Ö6.18

- a) Partialbråksuppdelning
- b) Polynomdivision
- c) Partialbråksuppdelning

Ö6.19

- a) Uppdelning i två integraler, den ena med derivatan av nämnaren i täljaren
- b) Uppdelning i två integraler, den ena med derivatan av nämnaren i täljaren, den andra med nämnare som passar arctangens' derivata
- c) Partialbråksuppdelning

Ö6.20

- a) Tre faktorer i nämnaren och sedan partialbråksuppdelning
- b) Fyra faktorer i nämnaren och sedan partialbråksuppdelning

L5.13-5.15

a-c) Ansatser enligt svaret på teorifråga 8

L5.16

- a) Polynomdivision
- b) Partialbråksuppdelning
- c) Partialbråksuppdelning
- d) Partialbråksuppdelning

L5.26

- a) Substitution av nämnaren
- b) Substitution av $4x$
- c) Utbrytning av 4 och substitution av $\frac{3x}{2}$
- d) Substitution av nämnaren
- e) Substitution av "inre funktionen"
- f) Substitution av $x + 2$
- g) Partiell integration
- h) Partiell integration med en etta
- i) Omskrivning med logaritmlag
- j) Substitution av "inre funktionen"
- k) Substitution $x = t^2$ följt av upprepad partiell integration
- l) Substitution av "inre funktionen"

L5.29

Partialbråksuppdelning och anpassning av konstanten

L5.33

- a) Bestäm $\int e^x \sin x \, dx$ och $\int e^x \cos x \, dx$ genom partiell integration med "deja vu".

$$\text{Integrera sedan enligt } \int x e^x \sin x \, dx = \int \overbrace{(e^x \sin x)}^{\uparrow} \underbrace{x}_{\downarrow} \, dx = \dots$$

- b) Bestäm $\int e^x \sin x \, dx$ och $\int e^x \cos x \, dx$ genom partiell integration med "deja vu".

$$\text{Integrera sedan enligt } \int x e^x \cos x \, dx = \int \overbrace{(e^x \cos x)}^{\uparrow} \underbrace{x}_{\downarrow} \, dx = \dots$$

Ö6.21

- Konjugatregeln för fyra nya faktorer och sedan partialbråksuppdelning
- Partiell integration och partialbråksuppdelning av ny integral
- Partiell integration och partialbråksuppdelning av ny integral

Ö6.29

Partialbråksuppdelning med fyra uttryck och anpassning av konstanten

Ledtrådar för lösning av uppgifter efter föreläsning 2:

Ö6.22

- Se svaret i teorifråga 10, svaret kan också skrivas som $\ln \sqrt{\frac{1+\sin x}{1-\sin x}} + C$
- Definitionen av $\tan x$ samt "derivatan av nämnaren i täljaren"
- Se svaret i teorifråga 10
- Variant I: "Trigettan" och "cosinus för dubbla vinkeln" två gånger
Variant II: Eulers formel och utveckling av produkten

Ö6.26

- Se teorifråga 9
- Se teorifråga 9
- Studera svaren i a och b

Ö6.23

- Se svaret i teorifråga 10
- Se svaret i teorifråga 10
- Eulers formler

Ö6.24

Svår...

- Additionssats i täljaren, sinus för dubbla vinkeln i både täljare och nämnare, förkorta, en av termerna ger till slut integral som löses genom partialbråksuppdelning.
- Substitution enligt exempel 5.35

c) Substitution enligt exempel 5.35 och svaret blir $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} - (1 - \sqrt{2})}{\tan \frac{x}{2} - (1 + \sqrt{2})} \right| + C$

Ö6.25

- a) Substitutionen $u = \sqrt{x-2}$, $u^2 = x-2$, $2u \frac{du}{dx} = 1$ o.s.v. samt polynomdivision
- b) Substitutionen $u = \sqrt{x-1}$, $u^2 = x-1$, $2u \frac{du}{dx} = 1$ o.s.v. samt polynomdivision
- c) Substitutionen $u = \sqrt{x-1}$, $u^2 = x-1$, $2u \frac{du}{dx} = 1$ o.s.v. samt polynomdivision

Ö6.27

- a) Se exempel 5.36 i läroboken
- b) Se exempel 5.36 i läroboken

L5.19

- a) "Trigettan" och substitution av $\cos x$
- b) Substitution av hela nämnaren
- c) "Cosinus för dubbla vinkeln" två gånger

L5.24

- a) Substitutionen $y = \sqrt{x-1}$ ger $x = 1 + y^2$, därefter polynomdivision
- b) Substitutionen $y = x-2$ gör att man slipper förstgradstermen under roten, sedan separata integraler, den ena med substitution och den andra med hjälp av derivatan för arcussinus i den andra

L5.22 Substitution enligt texten och studera gärna Exempel 5.35

L5.23 Se exempel 5.35

L5.30

- a) Partiell integration
- b) Förläng med e^{-x} och sedan substitution av hela nämnaren
- c) Partiell integration och partialbråksuppdelning av andra integralen
- d) Partiell integration och partialbråksuppdelning av andra integralen efter förlängning med $4x$
- e) Substitution av "inre funktionen"
- f) $\tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x}$
- g) Se teorifråga 10
- h) Se teorifråga 10
- i) Substitution enligt exempel 5.35

L5.31

- a) Kvadratkomplettering i nämnaren och substitution av $x - 1$
- b) Substitution av hela täljaren
- c) Substitution av hela uttrycket med en hel del omskrivning
- d) Partiell integration
- e) Kvadratkomplettera under rottecknet, utbrytning av 4, substitution
- f) Förläng med x , substitution av rotuttrycket, partialbråksuppdelning

Ö6.28 Tips i texten, vid partiell integration får man "deja vu" i högerledet efter smart hantering av rotfunktion (+1 och -1 i täljaren).

Ledtrådar för lösning av uppgifter efter föreläsning 3:

- Ö7.1 Skissa trappfunktionens graf och studera integralen
- Ö7.2 a) och c) Skissa över- respektive undertrappa med fem lika långa delintervall och bestäm sedan över- och undersumman ur figuren.
- d) Lös integralen
- Ö7.4 Funktionen är strängt avtagande inom aktuellt intervall, vilket kan visas. Bestäm över- och undertrappa med enbart ett långt del-intervall och jämför olikhetens gränser.

Ledtrådar för lösning av uppgifter efter föreläsning 4:

- Ö7.5 Instängning av ξ mellan x och $2x$ enligt Medelvårdessatsen för integraler (Sats 6.5) samt förenkling
- Ö 7.6 Skissa figur med kurva till funktionen $f(x) = \arctan x$, instängning av ξ mellan n och $n + 1$ enligt Medelvårdessatsen för integraler (Sats 6.5) samt förenkling
- Ö 7.7 Två exempel på två olika ösningsmetoder:
- I) Den korta vägen:
- Direkt tillämning av Analysens huvudsats (Sats 6.7) – gärna med hjälp av "Krzysztofs formel" från föreläsningen
- Skissa figur med kurva till funktionen $f(t) = \frac{e^{-t^2}}{t}$. Markera integralen med högergränsen x samt en motsvarande integral med närliggande högergränsen $x + h$. Differensen mellan dessa integraler förs in som täljare i derivatans definition, förenkla i täljaren med hjälp av Räknerregel 6.2 (e) för integraler (Sats 6.2). Instängning av ξ mellan x och $x + h$ enligt Medelvårdessatsen för integraler (Sats 6.5) samt förenkling.
- II) Den korta vägen:
- Direkt insättning i huvudsatsens (Stas 6.7)

Ö 7.8 Exempel på två olika lösningsmetoder:

I) Den korta vägen:

Direkt tillämning av Analysens huvudsats (Sats 6.7) – gärna med hjälp av ”Krzysztofs formel” från föreläsningen

II) Den långa men nyttiga vägen som bygger på beviset av Analysens huvudsats:

Skissa figur med förenklad kurva till funktionen $f(t) = \frac{\sin t}{t}$. Markera integralen med högergränsen x samt en motsvarande integral med närliggande högergränsen $x + h$. Differensen mellan dessa integraler förs in som täljare i derivatans definition, förenkla i täljaren med hjälp av Räknerregel 6.2 (e) för integraler (Sats 6.2). Instängning av ξ mellan x och $x + h$ enligt Medelvärdesatsen för integraler (Sats 6.5) samt förenkling.

L 6.4 Samma metod som i Ö7.7 och Ö7.8, teckenfel fås lätt i (b) om man missar att integralerna har variabel vänstergräns.

Ö7.12 Alla uppgifter löses med hjälp av standardprimitiver och Insättningsformeln sats 6.8

Ö7.13

- Partiell integration samt Insättningsformeln
- Partiell integration (derivata $\ln x$ denna gång) samt Insättningsformeln
- Partiell integration med en faktor 1 samt Insättningsformeln
- ”Derivatans av nämnaren i täljaren” samt Insättningsformeln
- Substitution av inre funktion samt Insättningsformeln
- Substitution av inre funktion samt Insättningsformeln
- Substitution av inre funktion samt Insättningsformeln
- Substitution av inre funktion samt Insättningsformeln

Ö7.14

- Partialbråksuppdelning
- Substitution av inre funktion osv.
- Substitution av inre funktion samt partiell integration
- Partiell integration med faktor 1 osv.
- Ersätt $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ och sedan substitution av $\tan x$ osv.
- Substitution av inre funktion osv.

L6.8

- Dela upp i två integraler – en med derivatan av nämnaren i täljaren och en vars nämnare kvadratkompletteras, insättningsformeln
- Partiell integration, insättningsformeln
- Partiell integration med derivering av logaritmen, insättningsformeln

d) Uppdelning i två integraler utifrån beloppet.

L6.10

- a) Substitution av inre funktion, insättningsformeln
- b) Substitution av inre funktion, insättningsformeln
- c) Substitution $x = t^3$, insättningsformeln
- d) Förläng med $\cos x$, derivatans nämnare i täljaren, insättningsformeln

L6.11

- a) Substitution av inre funktion och partiell integration
- b) Substitution $y = \tan x$
- c) Uppdelning i två integraler pga. beloppet
- d) Uppdelning i två integraler pga. beloppet
- e) Partiell integration
- f) Substitution $y = \sin x$

L6.12

- a) Krzysztofs formel
- b) Krzysztofs formel

L6.3

b) Vad närmar sig $f(\xi)$?

L6.26

- a) Partiell integration med faktorn 1
- b) Substitution $y = e^x$
- c) Substitution av inre funktion

L6.29

Skissa graf för att förstå problemet, Analysens huvudsats och sätt $f'(x) = 0$

Ö7.15

- a) Ledning i häftet
- b) Substitution $x = t^3$ följt av partiell integration
- c) Partiell integration med faktorn 1
- d) Förläng med $\cos x$ och sedan derivatan av nämnaren i täljaren
- e) Dela upp i två integraler pga. beloppet
- f) Dela upp i två integraler pga. beloppet

Ledtrådar för lösning av uppgifter efter föreläsning 5:

Ö7.69

a-l) Generaliseringen hävs, standardprimitiv, eventuellt divergens med sats 10.12

Ö7.70

- a) Generaliseringen hävs, förlängning med e^x , substitution
- b) Generaliseringen hävs och substitution
- c) Generaliseringen hävs och anpassning till $\frac{d}{dx} \arctan x$
- d) Generaliseringen hävs och derivatan av nämnaren i täljaren
- e) Generaliseringen hävs och partiell integration
- f) Generaliseringen hävs och partiell integration
- g) Generaliseringen hävs och partiell integration
- h) Generaliseringen hävs och substitution av $\ln x$
- i) Generaliseringen hävs och standardprimitiv
- j) Generaliseringen hävs och partialbråksuppdelning
- k) Generaliseringen hävs och substitution av \sqrt{x}
- l) Kvadratkomplettera innanför roten sedan standardprimitiv med arcussinus.

L6.23

- a) Generaliseringen hävs, standardprimitiv alternativt visas divergent med sats 10.12
- b) Generaliseringen hävs, partiell integration
- c) Generaliseringen hävs, anpassning till $\frac{d}{dx} \arctan x$
- d) Generaliseringen hävs, uppdelning i två integraler, anpassning till $\frac{d}{dx} \arctan x$ respektive "derivatan av nämnaren i täljaren" – den senares divergens ev. med sats 10.12
- e) Generaliseringen hävs, substitution av $1 - x$
- f) Generaliseringen hävs, kvadratkomplettera innanför roten, primitiv funktion med arcussinus...

L6.24

- a) Generaliseringen hävs, partiell integration
- b) Generaliseringen hävs, partiell integration och partialbråksuppdelning
- c) Generaliseringen hävs, förlängning med e^x , substitution, partialbråksuppdelning...
- d) Generaliseringen hävs och partialbråksuppdelning

L10.16

$$a) \int_1^{\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1} dx = \int_1^{\infty} \frac{x^2}{x^4} \cdot \underbrace{\frac{1+1/x^2}{1+1/x^4}}_{\substack{\leq 2 \\ > 1}} dx \leq \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} \cdot 2 dx = \dots$$

$$b) \int_0^1 \frac{1}{x+\sin x} dx \geq \int_0^1 \frac{1}{x+x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx = \dots$$

L10.17

a) $\int_1^{\infty} \frac{1}{1+x^4} dx \leq \int_1^{\infty} \frac{1}{x^4} dx = \dots$

b) $\int_0^{\infty} \frac{x^2+1}{x^3+1} dx = \int_0^1 \frac{x^2+1}{x^3+1} dx + \int_1^{\infty} \frac{x^2 \overbrace{(1+1/x^2)}^{>1}}{x^3 \underbrace{(1+1/x^3)}_{\leq 2}} dx \geq \int_0^1 \frac{x^2+1}{x^3+1} dx + \int_1^{\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2} dx \dots$

L6.25

- a) Generaliseringen hävs, fundera över hur divergens undviks, ev. med Sats 10.12
- b) Generaliseringen hävs, fundera över hur divergens undviks, ev. med Sats 10.12
- c) Generaliseringen hävs med två integraler, fundera över hur divergens undviks, ev. med Sats 10.12
- d) Substitution av $\ln x$, fundera över hur divergens undviks, ev. med Sats 10.12

L6.26

- a) Partiell integration med faktorn 1
- b) Substitution av e^x
- c) Substitution av $1 + \sqrt{x}$ och glöm ej nya gränser.
- d) Symmetrin utnyttjas, Generaliseringen hävs, partiell integration

L6.30

- a) Generaliseringen hävs, partiell integration med primitiv funktion av $\frac{e^x}{(1+e^x)^2}$ och kräver sedan variabelskiftet...

Ledtrådar för lösning av uppgifter efter föreläsning 6:

- L7.1 Identifiera rötter och sedan över- och underfunktion – ställ sedan upp integral.
- Ö7.18 Skissa begränsande linjer och kurva, identifiera rötter och sedan över- och underfunktion – ställ sedan upp integral.
- Ö7.19 Skissa kurvor, identifiera rötter och sedan över- och underfunktion – ställ sedan upp integral.
- Ö7.46 Ställ upp uttrycket för bågelementet ds (generellt) och tillämpa det på funktionen.
- Ö7.44 Ställ upp uttrycket för bågelementet ds (generellt) – notera att x och y beror av t – och tillämpa det på funktionen.
- L7.2 Skissa ellipsen, välj en fjärdedel av ytan (i första kvadranten) genom symmetri, lös ut y som en funktion av x och ställ upp integralen som löses med stöd av exempel 5.40 på sid 269.

- L7.3 Fundera över kurvans utseende, ställ upp uttrycket för arean av en sektor dA och lös integralen med hjälp av $\cos^2 \varphi = \frac{1+\cos 2\varphi}{2}$ eller Eulers formel (ex 5.34).
- L7.4 Bestäm skärningspunkter, över- och underfunktion, ställ upp integralen
- L7.6 Fundera över kurvans utseende, ställ upp uttrycket för arean av en sektor dA och lös integralen.
- L7.8 Ställ upp uttryck för bågelement på parameterform och integrera. I a) fås ett stort uttryck som kan förenklas kraftigt med hjälp av triggettan.
- L7.9 Ställ upp uttryck för bågelement på polär form och integrera. Notera att då φ^2 bryts ut får man $|\varphi|$ och φ duger endast om man integrerar inom $[0, \pi]$ och dubblar svaret.
- L7.10 Ställ gärna upp uttrycket för bågelementet ds (generellt) och tillämpa det på funktionen, förenkling ger $ds = \frac{1+x^2}{1-x^2}$ (nämnaren $1 - x^2$ för att få positivt tecken inom aktuellt intervall) som efter polynomdivision och PBU ger en enkel integral.
- Ö7.48 Ställ upp integralen med hjälp av funktion på parameterform och Trigettan ger enkel lösning, alternativt övre halvan av enhetscirkelns ekvation som till slut, efter en del förenkling, ger en enkel integral.
- L7.39
- Partiell integration
 - Studera inversen

Ledtrådar för lösning av uppgifter efter föreläsning 7:

- Ö7.25 Identifiera rotationskroppen, ställ upp uttryck för en delvolym $dV = \pi 25x^2 dx$ och summera dessa med en integral.
- Ö7.27 Identifiera rotationskroppen, ställ upp uttryck för en delvolym dV och summera dessa med en integral.
- Ö7.26 Ställ upp uttryck för en delvolym $dV = \frac{x}{(x+1)^2} dx$ och summera dessa med en integral.
- Ö7.30 Låt den räta linjen $y = \frac{R}{h} x$ alstrat en liggande kon, mellan origo och $x = h$. Delvolymen $dV = \pi \left(\frac{R}{h} x\right)^2 dx$ summeras längs x-axeln mellan $x = 0$ och $x = h$.
- Ö7.35 Ställ upp uttryck för en delvolym $dV = y dy$ och summera dessa med en integral.
- Ö7.36 Ställ upp uttryck för en delvolym $dV = 2\pi x \ln x dx$ och summera dessa med en integral.

- Ö7.59 Volymen beräknas med delvolym $dV = \pi(x^3)^2$ medan arean beräknas med ytelement som har omkretsen $O = 2\pi x^3$ och bredden $ds = \sqrt{1 + (3x^2)^2} dx$
- Ö7.61 Låt den räta linjen $y = \frac{R}{h}x$ alstrat en liggande kon, mellan origo och $x = h$. Ytelementen har då omkretsen $O = 2\pi \frac{R}{h}x$ och bredden $ds = \sqrt{1 + \left(\frac{R}{h}\right)^2} dx$. Arean fås genom integration längs x-axeln mellan $x = 0$ och $x = h$.
- Ö7.73 Ledning i läroboken, se även sid 331 med jämförande integral
- L7.25 Ytelementen har omkretsen $O = 2\pi x^3$ och bredden $ds = \sqrt{1 + (3x^2)^2} dx$.
- L7.14 a) Runt y-axeln fås delvolym av "skivor" radien $y = \sin 2x$ och tjockleken dx – alltså $dV = \pi \sin^2 2x dx$
- b) Runt y-axeln fås delvolym av "rör" med omkretsen (längden) $O = 2\pi x$, höjden $y = \sin 2x$ och tjockleken dx
- L7.17 Ledning i läroboken
- L7.26 Ytelementen har omkretsen $O = 2\pi x$ runt y-axeln och bredden $ds = \sqrt{1 + \frac{1}{x}} dx$.
- L7.36 Förskjutning så att området roterar runt y-axeln känns enklare. Volymen fås då genom "rör" med omkretsen $O = 2\pi x$, höjden $y = \sin^2 x$ och tjockleken dx mellan $x = \pi$ och $x = 2\pi$.
- L7.38 Volymen fås genom "rör" med omkretsen $O = 2\pi(1 - x)$ runt linjen $x = 1$, höjden $y = \frac{x}{x^2 + 3x + 2}$ och tjockleken dx mellan $x = 0$ och $x = 1$. Integralen löses med PBU.

Ledtrådar för lösning av utskrivna uppgifter efter föreläsning 8:

P1

- a) Två egenskaper från föreläsningen – en för funktionens y -värden och en för integralens värde.
- b) Anpassning av c så att $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1$ (alltså 100 %).
- c) Integrera från $x = 0$ och åt höger.
- d) Egenskaper utifrån des derivata och värdemängd samt rörande kontinuitet.
- e) Den primitiva funktionen bestäms (koefficienten c är redan känd) och den nya konstanten C som erhålls måste anpassas så att fördelningsfunktionen växer just mellan $y = 0$ och $y = 1$.
- f) Se b) ovan men, inom det nya intervallet.
- g) Har integralen något värde till höger om $x = 8$?
- h) Se e) ovan men för denna funktion måste C anta ett annat värde än 0 för att den skal växa från $y = 0$ till $y = 1$.

P2

Använd gärna en webbsida (t.ex. www.rechneronline.de) för att skissa kurvorna inom rätt intervall.

P3

- a) Två egenskaper från föreläsningen kontrolleras – en för funktionens y -värden och en för integralens värde.
- b) Den primitiva funktionen bestäms (koefficienten c är känd) och den nya konstanten C som erhålls måste anpassas så att fördelningsfunktionen växer just mellan $y = 0$ och $y = 1$.

P4

Notera att i uppgiften ges *fördelningsfunktion* $F_X(x)$ och inte täthetsfunktion $f_X(x)$. Detta missar många.

- a) Sätt $F_X(x) = \alpha = 0.25$ och beräkna det sökta x -värdet.
- b) Integralens svar sätts till 0.25.
- c) Med fördelningsfunktionen $F_X(x) = \alpha = 0.5$ samt med integral vars svar sätts till 0.5.
- d) Med metoderna i c) sätts svaren till α .
- e) Vad händer med x i fördelningsfunktionen, eller vad händer med högergränsen b ur integralen, om α närmar sig 1?

P5

- a) Integral fram till $x = 0$.
- b) Integrals svar sätts till 0.25.
- c) Integrera den högra täthetsfunktionen till 0.1.
- d) Se till att fördelningsfunktionerna får rätt konstanter C .
- e) Använd den högra fördelningsfunktionen och ge den funktionsvärdet 0.5.

P6

- a) Undersök om fördelningsfunktionen är kontinuerlig – är den inte så kan den omöjligt vara deriverbar.
- b) Se definitionen.

P7

- a) Integral av täthetsfunktionen eller differens av fördelningsfunktionens värden.
- b) Hur brett är intervallet?
- c) Generaliserad integral från $x = 4$.

P8

- a) Integralens värde = 0.5, sök högergränsen. Eller sätt funktionsvärdet till 0.5 hos korrekt fördelningsfunktion (med rätt konstant C).
- b) Integralens värde = 0.99, sök högergränsen. Eller sätt funktionsvärdet till 0.99 hos korrekt fördelningsfunktion (med rätt konstant C).

P9

- a) Integralens värde = 0.5, sök högergränsen. Eller sätt funktionsvärdet till 0.5 hos korrekt fördelningsfunktion (med rätt konstant C).
- b) Se definitionen för väntevärde.
- c) Se definitionen för variansen.
- d) Roten av variansen.

P10

- a) Se definitionen för väntevärde.
- b) Se definitionen för variansen och sedan roten av den.
- c) Sökt är $P\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{\sqrt{18}} < X < \frac{2}{3} + 2\frac{1}{\sqrt{18}}\right)$ som fås genom integration men tänk på att inte integrera utanför intervallet $\in [0, 1]$, vilket är lätt gjort då högergränsen $2\frac{1}{\sqrt{18}} > 1$.
- d) Sökt är $P\left(\frac{2}{3} - 2\frac{1}{\sqrt{18}} < X < \frac{2}{3} + \frac{1}{\sqrt{18}}\right)$ som fås genom integration och i detta fall ryms integrationsgränserna inom $x \in [0, 1]$.

Ledtrådar för lösning av uppgifter efter föreläsning 9:

- Ö9.1 Se föreläsning – polynomen är Maclaurin-polynom till den ursprungliga funktionen
- Ö9.7a) Ledande frågor: Runt vilket x -värde skall polynomet approximera den ordinära funktionen? Är det frågan om ett Maclaurinpolynom? Hur många gånger måste den ordinära funktionen deriveras för att angiven grad hos polynomet skall erhållas? Hur ser formeln ut som används för att ställa upp polynomet?
- Ö9.3 Taylors formel runt $x = 0$ ger givetvis samma resultat som Maclaurin...
- Ö9.4 Taylors formel
- Ö9.5 Taylors formel
- L8.2 Maclaurins formel, nu med restterm
- L8.3 Taylors formel, med restterm
- L8.4 Använd Maclaurins formel och försök att se mönster under utvecklingen.
- L8.5 Använd Maclaurins formel.
- L8.6 Använd Maclaurins formel.
- Ö9.6 Vilket tecken har den första strukna och samtidigt dominerande termen (oavsett sida om $x=0$) i en längre Maclaurin-utveckling?
- Ö9.7bc) Maclaurins formel på alla
- Ö9.7d) Maclaurins formel på respektive faktor och multiplicera sedan ihop polynomen.
- Ö9.22

a) Lös ut x ur $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+x} = e$

b) Beräkna

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} - \frac{1}{n} = \left. \begin{array}{l} x = \frac{1}{n} \\ n \rightarrow \infty \\ x \rightarrow 0^+ \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln(1+x)} - x = \dots$$

genom att göra liknämigt och sedan utnyttja Maclaurin

Ledtrådar för lösning av uppgifter efter föreläsning 10:

Ö9.8

- a) När Maclaurinpolynomet tas fram deriveras $\sin 3x$ fem gånger
- b) Maclaurinpolynomet för $\sin t$ tas fram och t ersätts sedan med $3x$.

Ö9.9

- a) Maclaurinpolynomet för e^x tas fram och multipliceras $1 + x$ – se ledning i facit.
- b) Maclaurinpolynomet för $\sin x$ tas fram och multipliceras x .
- c) Maclaurinpolynomet för e^t tas fram och t ersätts sedan med x^2 . Polynomet multipliceras sedan med motsvarande för $\sin x$.
- d) Använd utvecklingen för $\arctan x$ på sid. 360.

Ö9.10

- a) Maclaurinpolynomet för $\ln(1 + t)$ tas fram och t ersätts sedan med $2x^2$.
- b) Maclaurinpolynomet för $\frac{1}{\sqrt{1+t}}$ tas fram (se Sats 8.3 e) och t ersätts sedan med $-2x$.
- c) Maclaurinpolynomet för e^t tas fram och t ersätts sedan med Maclaurinpolynomet för $\sin x$.
- d) Maclaurinpolynomet för $\arctan x$ tas fram sedan deriveras båda leden.

Ö9.12

a–d) Alla elementära funktioner som inte är polynom ersätts med Maclaurinpolynom och gränsvärdet kan då kontrolleras. Kontrollera gärna med l'Hospitals regel.

L8.8

- a) Maclaurinutveckling av faktorerna separat, multiplicera sedan dessa, både polynomen och resttermerna.
- b) Utveckla $(1 + t)^{\frac{1}{2}}$ och $\arctan x$ separat. Ersätt sedan t med utvecklingen av $\arctan x$

L8.9

- a) Utveckla e^x och $(1 + t)^{\frac{1}{2}}$. Ersätt sedan t med $2x$.
- b) Utveckla $\arctan x$ och gör sedan liknämngt.

L8.10

Utveckla e^u och $\cos v$. Ersätt sedan u med ax samt v med \sqrt{x} .

L8.11

- a) Skriv sedan om uttrycket till $x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$. Utveckla $\ln(1 + u)$ och ersätt u med $\frac{1}{x}$ osv.
- b) Variabelskifte $t = x - 1$ förenklar så att Maclaurin-utvecklingar kan användas.

L8.13

Utveckla $\cos x$ och $\arctan x$. Multiplicera sedan den första med 2 och kvadrera den andra utvecklingen. Gör sedan en studie av den dominerande termen.

L8.14

- a) Utveckla e^u och $\sin x$. Ersätt sedan u med utvecklingen av $\sin x$
- b) Som ovan men med $\cos x$ – notera att alla termer innehåller termer av grad noll

Ö9.11

Utveckla $\sin v$. Ersätt sedan v med $2x^2$ och polynomdividera med $x + 1$.

- Ö9.21 Utveckla täljaren och anpassa a och b så att gränsvärde existerar (det blir $5/2$). Detta styr sedan c .
- L8.23 Utveckla $\sin x$ och $\ln x$ separat. Sätt sedan in $1 + \sin x$ i den yttre utvecklingen.
- L8.25 Maclaurin- eller Taylorutveckla och förenkla
- L8.27 Maclaurinutveckla och förenkla
- L8.29 Maclaurinutveckla och derivera sedan polynomet ett respektive två steg.

Ledtrådar för lösning av uppgifter efter föreläsning 11:

- L9.1 Se föreläsning
- L9.3 Derivera och sätt in. Anpassa sedan konstanten så att kravet uppfylls.
- Ö8.2 Lös först ut y' (om detta inte är gjort) och bestäm den primitiva funktionen y . Anpassa sedan konstanten C så att kravet uppfylls.
- Ö8.3 Eftersom att lösningarna blir $y = x^2 + C$ skissas ex. $y = x^2 - 1$, $y = x^2$, $y = x^2 + 1$ samt just den lösning som innehåller angiven punkt tack vare $C = 3$.
- Ö8.4
- Primitiv funktion och anpassning av konstanten C .
 - Lös först ut y' , bestäm den primitiva funktionen som faktiskt är en standardprimitiv. Anpassning av C därefter.
 - Lös först ut y' och bestäm den primitiva funktionen. Anpassning av C därefter.
- Ö8.12
- a-c) Alla tre kan lösas med hjälp av integrerande faktor (metod 1) eller genom att man separerar variablerna (metod 3). b) kan även lösas genom homogen + partikulär lösning tack vare att den är "linjär med konstanta koefficienter".

d) Löses med integrerande faktor. Alltså genom att multiplicera med x i båda leden och inse att vänsterledet är derivata av produkt enligt $\frac{d}{dx}(xy) = y + xy'$. Integrera i båda leden och lös ut y .

e) Löses med integrerande faktor. Alltså genom att multiplicera med $\sin x$ i båda leden och inse att vänsterledet är derivata av produkt enligt $\frac{d}{dx}(y \sin x) = y' \sin x + y \cos x$. Integrera i båda leden. Högerledet kräver partiell integration eller genom $\int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C = \frac{x}{2} - \frac{\sin x \cos x}{2} + C$. Division med $\sin x$ ger sedan y .

f) I denna uppgift krävs först division med x i båda leden för att få normalform. Sedan multiplikation med en integrerande faktor $e^{\frac{x^2}{2}}$ så att vänsterledet bildar en

derivata av produkt enligt $\frac{d}{dx} \left(ye^{\frac{x^2}{2}} \right) = \left(y'e^{\frac{x^2}{2}} + yxe^{\frac{x^2}{2}} \right)$. Högerledet $HL = xe^{\frac{x^2}{2}}$.

Integrering av båda leden ger $ye^{\frac{x^2}{2}} = e^{\frac{x^2}{2}} + C$. Till sist löses y ut genom division med $e^{\frac{x^2}{2}}$ och villkoret ger $C = 1$.

g) Multiplikation med en integrerande faktor e^{x+x^2} och vänsterledet bildar en derivata av produkt – i detta fall $VL = \frac{d}{dx} (ye^{x+x^2}) = (y'e^{x+x^2} + y(1 + 2x)e^{x+x^2})$. Högerledet förenklas enligt $e^{x+x^2} e^{-x^2} = e^x$. Leden integreras och y löses ut.

h) Variablerna separeras och man får $\frac{1}{y} dy = \frac{1}{1+x^2} dx$. Genom att integrera båda leden kan sedan y lösas ut.

i) Vänsterledet är från början en derivata av produkt enligt $\frac{d}{dx} (xy) = y + xy'$. Genom att integrera båda leden kan y lösas ut och villkoret ger till sist $C = 1$.

Ö8.24 a-f) Separera variabler och integrera i båda leden. Fundera sedan över lösningens definitionsmängd – alltså tillåtna x -värden.

Ö8.25 Separera variabler och integrera i båda leden. Anpassa sedan konstanten.

L9.5 a) Metod 1: Skriv ekvationen på normalform. Med hjälp av en integrerande faktor $e^{\frac{x}{4}}$ skrivs vänsterledet som en derivata av produkt, integrera och lös ut y .

Metod 2: Separera variablerna och integrera i båda leden.

Metod 3: (Från Matematik E) Ansats $y = Ce^{rx}$ ger karakteristisk ekvation

$$r + \frac{1}{4} = 0 \text{ som ger den homogena ekvationens lösning } y = Ce^{-\frac{x}{4}}$$

b) Metod 1: Skriv ekvationen på normalform. Med hjälp av en integrerande faktor $e^{-\arctan x}$ skrivs vänsterledet som en derivata av produkt, integrera och lös ut y .

Metod 2: Separera variablerna och integrera i båda leden.

c) Metod 1: Ekvationen är redan skriven på normalform. Med hjälp av integrerande faktor e^{-2x} skrivs vänsterledet som en derivata av produkt, integrera och lös ut y .

Metod 2: (från Matematik E) Den homogena ekvationen löses genom att man sätter $HL = 0$, ansats $y_h = Ce^{rx}$ ger karakteristisk ekvation $r - 2 = 0$ som ger den homogena ekvationens lösning $y_h = Ce^{2x}$. Vidare så görs ansatsen $y_p = Ax + B$ och $y_p' = A$ baserad på att högerledets och vänsterledets utseende. Insättning ger den partikulära lösningen $y_p = -\frac{x}{2} - \frac{1}{4}$ som tillsammans med $y_h = Ce^{2x}$ ger lösningen $y = Ce^{2x} - \frac{x}{2} - \frac{1}{4}$

d) Ekvationen är redan skriven i normalform. Med hjälp av en integrerande faktor e^{x+x^2} skrivs vänsterledet som en derivata av produkt. Integrera båda leden och lös ut y .

L9.6 Skriv ekvationen på normalform enligt $y' + \frac{10}{x}y = \frac{\ln x}{x}$. Med hjälp av en integrerande faktor $e^{10 \ln x} = e^{\ln x^{10}} = x^{10}$ skrivs vänsterledet som en derivata av produkt, integrera och lös ut $y = \frac{1}{10} \ln x - \frac{1}{100} + \frac{C}{x^{10}}$. Villkoret ger sedan $C = \frac{1}{100}$

L9.13 a-c) Separera variablerna, integrera och lös ut y .

L9.15 Separera variablerna, integrera och lös ut y . Villkoret ger $C = 1$. Lösningen $y = \ln \underbrace{(1 + \arctan x)}_{>0}$ kräver att $\arctan x > -1$ vilket sedan ger definitionsmängden.

Ö8.15 Separera variablerna. Skriv om VL som derivata av produkt med hjälp av en integrerande faktor $e^{2 \ln x} = e^{\ln x^2} = x^2$ och erhåll $\frac{d}{dx}(x^2 y) = x \cos x$. Integrera båda leden (partiell integration i HL) och därefter division för att lösa ut y .

L9.4a Se föreläsningen

L9.16 a) För $x > 0$ får man:

$$x \frac{dy}{dx} = 1 - y^2 \Leftrightarrow \frac{1}{1 - y^2} dy = \frac{1}{x} dx$$

Partialbråksuppdelning ger:

$$\frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1 + y} + \frac{1}{1 - y} \right) dy = \int \frac{1}{x} dx$$

Båda leden integreras:

$$\Leftrightarrow \ln(1 + y) - \ln(1 - y) = 2 \ln x + C$$

Villkoret $\begin{cases} x = 1 \\ y = \frac{1}{3} \end{cases}$ ger $C = \ln 2$ och

$$\ln \left(\frac{1 + y}{1 - y} \right) = \ln x^2 + \ln 2 \Leftrightarrow \ln \left(\frac{1 + y}{1 - y} \right) = \ln 2x^2 \Leftrightarrow \frac{1 + y}{1 - y} = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{y + 1}{y - 1} = -2x^2 \Leftrightarrow \frac{y - 1 + 2}{y - 1} = -2x^2 \Leftrightarrow 1 + \frac{2}{y - 1} = -2x^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{y - 1} = -1 - 2x^2 \Leftrightarrow \frac{y - 1}{2} = \frac{-1}{1 + 2x^2} \Leftrightarrow y = 1 + \frac{-2}{1 + 2x^2}$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{1 + 2x^2}{1 + 2x^2} + \frac{-2}{2x^2 + 1} \Leftrightarrow y = \frac{2x^2 - 1}{2x^2 + 1}$$

$$b) \begin{cases} x \frac{dy}{dx} = 1 - y^2 \\ x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \quad \text{ger att } \frac{dy}{dx} = 0 \text{ och } y = C = 1$$

L9.9 Skriv ekvationen på normalform. Med en integrerande faktor

$e^{-\ln(1+x^2)} = e^{\ln(1+x^2)^{-1}} = (1+x^2)^{-1} = \frac{1}{1+x^2}$ kan VL bilda en derivata av produkt. Integration (partiell integration i HL) följt, anpassning av konstanten och multiplikation med $1+x^2$ ger y .

L9.48 Separera variablerna (för $y \neq 0$), integrera (partiell integration krävs i HL) och lös ut y . Glöm inte att $y = 0$ faktiskt också är en lösning på ekvationen.

L9.49 Skriv ekvationen på normalform och hitta en integrerande faktor

$e^{-2 \ln(\cos x)} = e^{\ln(\cos x)^{-2}} = \frac{1}{\cos^2 x}$. Högerledet blir $\tan^3 x \frac{1}{\cos^2 x}$ som kan integreras med hjälp av substitutionen $u = \tan x$ med $\frac{du}{dx} = \frac{1}{\cos^2 x}$.

L9.17 Separera variablerna och PBU i VL ger ekvationen $\frac{1}{a-b} \left(\frac{1}{a-y} + \frac{1}{b-y} \right) dy = k dt$.

Integrera i båda leden och villkoret ger $C = \ln \frac{a}{b}$. Därefter löses y ut.

L9.51 Skriv ekvationen på normalform. Multiplikation med en integrerande faktor

$e^{-2 \ln(x+1)} = \dots = \frac{1}{(x+1)^2}$ ger derivata av produkt i VL. Integrera och villkoret ger $C = 1$. Därefter löses y ut.

Ö8.14 a) Dividera båda leden med $(1+x^4)^2$ så att man får

$$\frac{1}{1+x^4} y' - \frac{4x^3}{(1+x^4)^2} y = \frac{x^7}{(1+x^4)^2}$$

med ett vänsterled som är derivata av produkt enligt:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1+x^4} y \right) = \frac{x^7}{(1+x^4)^2}$$

Integrera i båda leden och lös högerledet enligt:

$$\int \frac{x^7}{(1+x^4)^2} dx = \left[\begin{array}{l} t = x^4 \\ \frac{dt}{dx} = 4x^3 \\ \frac{1}{4} dt = x^3 dx \end{array} \right] = \frac{1}{4} \int \frac{\overset{\uparrow}{1}}{(1+t)^2} \underset{\downarrow}{t} dt = \dots$$

Man får nu ett uttryck ur vilket y kan lösas ut:

$$\frac{1}{1+x^4}y = -\frac{1}{4}\frac{x^4}{1+x^4} + \frac{1}{4}\ln(1+x^4) + C$$

Ledtrådar för lösning av uppgifter efter föreläsning 12:

- Ö8.37 Lösningstips i slutet av häftet
- Ö8.38 a-d) Bestäm och lös karakteristisk ekvation och tag sedan hänsyn till begynnelsevillkoren när konstanterna bestäms.
- L9.21 Karakteristiska ekvation ställs upp. Om man är ambitiös gör man det genom ansats med $y = Ce^{rx}$ samt åtföljande $y' = Cre^{rx}$ och $y'' = Cr^2e^{rx}$. Detta ger den karakteristiska ekvationen och y kan bestämmas. Konstanterna fås med hjälp av begynnelsevillkoren.
- Ö8.39 a-c) Lämplig ansats och *en* lösning y_p bestäms. Till denna kompletterar man med homogena ekvationens lösningar och får den allmänna lösningen – se Sats 9.1. Ytterligare ledning i slutet av häftet. Notera att i c) ansätter man ett fullständigt andragardspolynom till y_p' och inte till y .
- Ö8.40 a-c) Lämplig ansats och *en* lösning y_p bestäms. Till denna kompletterar man med homogena ekvationens lösningar och får den allmänna lösningen – se Sats 9.1. Ytterligare ledning i slutet av häftet.
- Ö8.41 Lämplig ansats och *en* lösning y_p bestäms. Till denna kompletterar man med homogena ekvationens lösningar och får den allmänna lösningen – se Sats 9.1.
- L9.23 a-c) Lämplig ansats och *en* lösning y_p bestäms. Till denna kompletterar man med homogena ekvationens lösningar och får den allmänna lösningen – se Sats 9.1. Ytterligare ledning på sid 536 i läroboken.
- Ö8.42 Lämplig ansats och *en* lösning y_p bestäms. Till denna kompletterar man med homogena ekvationens lösningar och får den allmänna lösningen – se Sats 9.1.
- a) $y_p = (a + bi)e^{2ix}$
b) $y_p = A \sin 2x + B \cos 2x$
c) $y_p = e^{3x}(A \sin x + B \cos x)$
d) $y_p = e^{3x}(A \sin x + B \cos x)$
- Ö8.43 Lämplig ansats och *en* lösning y_p bestäms. Till denna kompletterar man med homogena ekvationens lösningar och får den allmänna lösningen – se Sats 9.1.
- L9.26 Lämplig ansats och *en* lösning y_p bestäms. Till denna kompletterar man med homogena ekvationens lösningar och får den allmänna lösningen – se Sats 9.1. Begynnelsevillkoren möjliggör bestämning av konstanterna.

- L9.27 Lämplig ansats och *en* lösning y_p bestäms. Till denna kompletterar man med homogena ekvationens lösningar och får den allmänna lösningen – se Sats 9.1. Gränsvärdet och sedan begynnelsevillkoret möjliggör bestämning av konstanterna.
- L9.29 Ekvationen är homogen. Den karakteristiska ekvationen ger rent imaginära rötter och begynnelsevillkoren hjälper sedan att bestämma konstanterna.
- L9.22 Ekvationen är homogen. Den karakteristiska ekvationen ger rent imaginära rötter och begynnelsevillkoren hjälper sedan att bestämma konstanterna.
- L9.24 Lämplig ansats och *en* lösning y_p bestäms. Till denna kompletterar man med homogena ekvationens lösningar och får den allmänna lösningen – se Sats 9.1. Gränsvärdet och sedan begynnelsevillkoret möjliggör bestämning av konstanterna.
- L9.50 Ekvationen är homogen. Den karakteristiska ekvationen ger komplexa rötter och villkoret hjälper sedan att bestämma konstanterna.
- L9.52 Ekvationen är homogen. Den karakteristiska ekvationen ger komplexa rötter och villkoret hjälper sedan att bestämma konstanterna.